

Cinética Química

Prof. James Moraes de Almeida



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Um pouco de matemática

- Mostre que:

- $c(x, t) = \frac{n_0}{A(\pi Dt)^{1/2}} e^{-x^2/4Dt}$

- É solução da segunda lei de Fick:

- $\frac{\partial c(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c(x, t)}{\partial x^2}$


- Utilizem:

- $\frac{d}{dx} e^{-\frac{A}{x}} = \frac{A}{x^2} e^{-\frac{A}{x}}$

- $\frac{d}{dx} e^{-\frac{x^2}{A}} = -\frac{2x}{A} e^{-\frac{x^2}{A}}$


Célula combustível

- O que acontece em uma célula a combustível?
 - Fornecemos H_2 e O_2 .
 - Anodo:
 - $2\text{H}_2 + 2\text{O}^{2-} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$
 - Catodo:
 - $\text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{O}^{2-}$
 - Reação completa:
 - $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$




Soluções eletrolíticas

- Condutividade em soluções eletrolíticas.
 - Iônica:
 - Movimento dos íons:



Soluções eletrolíticas

- Condutividade em soluções eletrolíticas.
 - Iônica:
 - Movimento dos íons:
 - Na aula anterior vimos um cálculo empírico.
 - Agora vamos descrever o movimento dos íons.
 - O que acontece ao aplicarmos um campo elétrico?
 - $E = \frac{\Delta\phi}{l}$
 - $\Delta\phi$ é a diferença de potencial.
 - l é a distância entre os eletrodos.
 - E é o campo elétrico.



Soluções eletrolíticas

- Condutividade em soluções eletrolíticas.

- Iônica:

- Movimento dos íons:

- Na aula anterior vimos um cálculo empírico.

- Agora vamos descrever o movimento dos íons.


- O que acontece ao aplicarmos um campo elétrico?

- Com tal campo, os íons estarão sujeitos a uma força, que é dada por:

- $F = zeE = \frac{ze\Delta\phi}{l}$

- z é a carga do íons.

- e é a carga elementar.



Soluções eletrolíticas

- Condutividade em soluções eletrolíticas.

- Iônica:


- Movimento dos íons:

- Forças atuando nos íons:

- $F = \frac{ze\Delta\phi}{l}$

- Então é só acharmos a velocidade agora?

- Bom, se estivéssemos no vácuo sim.



Soluções eletrolíticas

- Condutividade em soluções eletrolíticas.

- Iônica:

- Movimento dos íons:


- Forças atuando nos íons:

- $F = \frac{ze\Delta\phi}{l}$

- Então é só acharmos a velocidade agora?

- Bom, se estivéssemos no vácuo sim.

- Mas estamos em uma solução.



Soluções eletrolíticas

- Condutividade em soluções eletrolíticas.

- Iônica:

- Movimento dos íons:

- Forças atuando nos íons:

- $F = \frac{ze\Delta\phi}{l}$

- Estamos em uma solução.

- Há uma fricção com o solvente:

- $F_{fric} = fS$

- $f = 6\pi\eta a$, relação de Stokes (Eq 18.31, seção 18.9 Atkins)

- S é a velocidade do íon.

Soluções eletrolíticas

- Condutividade em soluções eletrolíticas.
 - Iônica:
 - Movimento dos íons:
 - Forças atuando nos íons:
 - A força será zero quando a força do campo se igualar a força de fricção.
 - $zeE = fs$
 - $s = \frac{zeE}{f}$
 - Essa é a velocidade de deriva do íon.

Soluções eletrolíticas

- Condutividade em soluções eletrolíticas.

- Iônica:

- Movimento dos íons:

- $s = \frac{zeE}{f}$

- Essa é a velocidade de deriva do íon.

- É proporcional ao campo elétrico:


- $s = uE$

- Chamamos u de mobilidade iônica.

- $u = \frac{ze}{f} = \frac{ze}{6\pi\eta a}$

Soluções eletrolíticas

- Condutividade em soluções eletrolíticas.
 - Iônica:
 - Movimento dos íons:
 - Exemplo de prótons se movimentando.



Soluções eletrolíticas

- Atividade de aula:
 - Deduzam a relação de Stokes (Eq 18.31, seção 18.9 Atkins).
 - Notem que o exemplo é para centrifugação.
 - No Brasil enriquecemos urânio com centrifugação.



Marinha do Brasil

OBRIGADO

James Moraes de Almeida

ilum.cnpem.br



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

