

# Termodinâmica Avançada

---

Aula 05

Criticalidade e Transições de Fase

James Moraes de Almeida




- Mário José de Oliveira — Termodinâmica, capítulo sobre transições de fase.
- McQuarrie & Simon — Physical Chemistry: A Molecular Approach.
- Atkins & de Paula — Físico-Química, v. 1.

- Na Aula 04 introduzimos a equação de estado de van der Waals:
  - $(p + a/v^2)(v - b) = RT$
- O parâmetro  $a$  corrige a atração intermolecular.
- O parâmetro  $b$  corrige o volume próprio molecular.
- Nesta aula investigaremos condensação, coexistência de fases e criticalidade.

# Isotermas de van der Waals

$$A_{\text{abaixo}} = A_{\text{acima}}$$

A pressão de coexistência é aquela para a qual as duas áreas são iguais.




# O laço de van der Waals: instabilidade

- No laço existe um trecho com derivada positiva:
- Aumentar o volume aumentaria a pressão
  - Esse trecho é mecanicamente instável.
- O fluido separa-se em líquido e vapor.
  - Apresenta um patamar de pressão constante.
- A construção de Maxwell determina a pressão desse patamar.

# Construção de Maxwell (áreas iguais)

A igualdade das áreas determina a pressão de coexistência  $p_{\text{sat}}$ . Desloca-se o patamar até que as duas áreas se igualem; uma única altura satisfaz essa condição.



# O ponto crítico

- Ao aumentar a temperatura, o intervalo de coexistência diminui.
  - Em  $T_c$  ele se reduz a um único ponto.
- A isoterma crítica apresenta uma inflexão horizontal em  $T = T_c$ :
  - $(\partial p / \partial v)_T = 0$  e  $(\partial^2 p / \partial v^2)_T = 0$
- Acima de  $T_c$  não há fronteira entre líquido e vapor.
  - O sistema forma um fluido supercrítico.
    - Entraremos em mais detalhes no futuro.

## 11. Avaliamos a equação de estado no ponto crítico

$$v_c = 3b \qquad T_c = \frac{8a}{27Rb}$$

$$p_c = \frac{4a}{27b^2} - \frac{a}{9b^2}$$

Escrevemos  $a/(9b^2)$  com o denominador comum  $27b^2$ .

$$p_c = \frac{4a}{27b^2} - \frac{3a}{27b^2}$$

# Lei dos estados correspondentes

Partimos da equação de estado molar de van der Waals:

$$(p_r p_c + \frac{a}{(v_r v_c)^2})(v_r v_c - b) = R T_r T_c$$

Aplicamos  $(v_r v_c)^2 = v_r^2 v_c^2$  ao denominador.

$$(p_r p_c + \frac{a}{v_r^2 v_c^2})(v_r v_c - b) = R T_r T_c$$

# Exercício em sala

- Para o  $\text{CO}_2$ :  $T_c = 304,2 \text{ K}$  e  $p_c = 73,8 \text{ atm}$ .
- (a) Estime  $a$  e  $b$  a partir de  $T_c$  e  $p_c$ .
- (b) Calcule  $v_c = 3b$ .
- (c) Calcule  $Z_c = p_c v_c / (RT_c)$  com os valores previstos e verifique que resulta em  $3/8$ .
- (d) O valor experimental do  $\text{CO}_2$  é  $Z_c \approx 0,274$ . O que a diferença revela sobre a equação de van der Waals?
- Dado:  $R = 0,08206 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

- Faça em Python:
- 1. Trace isotermas do  $\text{CO}_2$  abaixo, em e acima de  $T_c$ .
- 2. Marque o ponto crítico ( $v_c, p_c$ ).
- 3. Faça a construção de Maxwell numa isoterma subcrítica.
- 4. Identifique  $v_\ell$  e  $v_g$  e discuta a aproximação de  $T_c$ .
- O uso de IA é permitido como apoio ao código, o importante é explicar a termodinâmica.

# OBRIGADO

---

James Moraes de Almeida  
[james.almeida@ilum.cnpem.br](mailto:james.almeida@ilum.cnpem.br)

[ilum.cnpem.br](http://ilum.cnpem.br)