

Termodinâmica Avançada

Aula 06


Potenciais Termodinâmicos

James Moraes de Almeida




O enigma

Ao condensar, as moléculas se organizam.



uma poça d'água a 25 °C
a energia sobe



vapor d'água sendo resfriado

- Na Aula 03 chegamos à equação fundamental na forma da energia:
 - $dU = T dS - p dV + \mu dN$
- As variáveis naturais de U são S , V e N ; as derivadas dão as três grandezas intensivas:
 - $T = (\partial U / \partial S)_{V,N}$ $-p = (\partial U / \partial V)_{S,N}$ $\mu = (\partial U / \partial N)_{S,V}$

A equação fundamental dá a energia interna em função de S , V e N :

$$dU = T dS - p dV + \mu dN$$

As variáveis naturais de U são S , V e N .

Na equação fundamental, as inclinações têm nome:

$$dU = T dS - p dV + \mu dN$$

Em cada termo, uma grandeza multiplica a diferencial da outra. As duas formam um par conjugado:

$$(T, S) \quad (-p, V) \quad (\mu, N)$$

S , V e N são as variáveis naturais de U ; T , $-p$ e μ são as conjugadas delas.

**E o V1 mostrou o laboratório fixando justamente as conjugadas.
Queremos trocar cada variável pela sua.**

A transformada de Legendre

- Trocar uma variável pela sua conjugada, usando só a regra do produto. Se
 - $df = u \, dx + w \, dy$
- então, pela regra do produto,
 - $d(wy) = y \, dw + w \, dy$
- e subtraindo uma da outra:
 - $d(f - wy) = u \, dx - y \, dw$
- A função $g \equiv f - wy$ tem x e w como variáveis naturais.

O que o vídeo anterior deixou pronto

Se a diferencial de f é

$$df = u dx + w dy$$

então, trocando y pela sua conjugada w :

$$g \equiv f - wy \quad dg = u dx - y dw$$

Iremos aplicar a transformada de Legendre para achar novos potenciais termodinâmicos.


Os quatro potenciais

- Cada transformada troca uma variável natural pela sua conjugada.
- Entalpia — troca V por p :
 - $H = U + pV$ $dH = T dS + V dp + \mu dN$
- Energia livre de Helmholtz — troca S por T :
 - $F = U - TS$ $dF = -S dT - p dV + \mu dN$
- Energia livre de Gibbs — troca as duas:
 - $G = U - TS + pV$ $dG = -S dT + V dp + \mu dN$

As derivadas de G

- A T e p constantes, o equilíbrio é o mínimo de G .
 - $dG = -S dT + V dp + \mu dN$
- Daí saem, por leitura direta:
 - $S = -(\partial G / \partial T)_{p,N}$ $V = (\partial G / \partial p)_{T,N}$ $\mu = (\partial G / \partial N)_{T,p}$
- E, pela extensividade da Aula 03, $G = \mu N$: o potencial químico é a energia livre de Gibbs molar.

Uma gota em equilíbrio com o próprio vapor



T e p fixos


Ninguém desenhou a interface. Ela emerge do mesmo integrador de Lennard-Jones das outras cenas, só com a temperatura mais baixa.

Dentro da gota cada partícula tem quatro ou cinco vizinhas; no vapor, nenhuma. As duas fases são a mesma substância, na mesma caixa.

Acompanhe a partícula destacada: ela vai sair da gota sozinha.

O equilíbrio não é ausência de travessia — é empate entre os dois sentidos.

Primeira ordem: a energia livre de Gibbs



G passa contínua. Só a inclinação muda de repente.

- Ehrenfest classifica a transição pela derivada da energia livre de Gibbs que se torna descontínua.
 - $S = -(\partial G / \partial T)_p$ $V = (\partial G / \partial p)_T$
- Primeira ordem: entropia ou volume apresentam salto; há calor latente. É a fusão e a vaporização.
- Transição contínua: as primeiras derivadas permanecem contínuas; as superiores divergem.
 - $C_p = -T(\partial^2 G / \partial T^2)_p$
 - No ponto crítico da Aula 05 os dois saltos vão a zero, e a transição deixa de ser de primeira ordem.



O símbolo $^\circ$, e de onde vêm os números

ΔG° é a variação no estado padrão: 1 bar, cada substância pura e na fase estável, na temperatura indicada — aqui, 298,15 K.


Para a água, a tabela traz a energia livre de Gibbs de formação:

$$\Delta_f G^\circ(\text{H}_2\text{O}, \ell) = -237,1 \text{ kJ/mol}$$

Formar a água libera 237,1 kJ/mol; decompô-la custa o mesmo, com o sinal trocado.


$$\Delta G^\circ = +237,1 \text{ kJ/mol}$$

O enigma resolvido



$$\Delta H > 0 \quad \Delta S > 0$$

evaporar



$$\Delta H < 0 \quad \Delta S < 0$$

condensar

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

a T alta, $T\Delta S$ vence

- A redução do CO_2 a metano, a 1 atm e 298,15 K, tem potencial $E = -0,24$ V:
 - $\text{CO}_2 + 8\text{H}^+ + 8\text{e}^- \longrightarrow \text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
 - (a) Calcule o ΔG molar, com $n = 8$, usando $\Delta G = -nFE$.
 - (b) Com energia elétrica a R\$ 1,00 por kWh, quanto custa produzir um mol de metano? E um quilograma?
 - (c) Ficou barato? O que a sua conta deixou de fora?
- Dados: $F = 96485$ C/mol; $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6$ J; $M(\text{CH}_4) = 16,0$ g/mol.

OBRIGADO

James Moraes de Almeida
james.almeida@ilum.cnpem.br

ilum.cnpem.br